Atmo votre parten'air NOUVELLE-AQUITAINE

BILAN ANNUEL 2024

Qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine

AVANT-PROPOS

Tous les bilans annuels
sur notre site internet

L'édition d'un bilan annuel de la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine est une obligation réglementaire applicable à chaque association agréée de surveillance de la qualité de l'air, conformément à l'arrêté ministériel du 16 avril 2021. Son article 18 stipule que « l'AASQA diffuse gratuitement et librement, sur son site internet, (...) chaque année, un bilan régional sur les résultats de la surveillance de la qualité de l'air (...) ». Il vise notamment à fournir des éléments sur la qualité de l'année passée, en comparant les concentrations mesurées aux seuils réglementaires qui leurs sont applicables. Le portail Open Data permet en outre de recueillir une quantité importante des résultats de la surveillance opérée par Atmo Nouvelle-Aquitaine.

Titre Bilan annuel qualité de l'air 2024 en Nouvelle-Aquitaine **Référence** MES_INT_24_056
Version finale du 02/06/2025 **Nombre de pages** 39 (couverture comprise)
Auteur Louise Declerck, ingénieure d'études **Vérification du rapport** Anthony Merlo, Louise Declerck, Sarah Le Bail
Validation du rapport Rémi Feuillade, directeur délégué production et exploitation

Plateformes de modélisation haute résolution : mises à jour approfondies *(données d'entrée, méthodologie)*
Ces outils connaissent en 2024 une mise à jour approfondie majeure. L'intégralité de la Nouvelle-Aquitaine est désormais couverte par de la modélisation haute résolution. Les évolutions principales sont : prise en compte de l'inventaire icare v3.2.4 – année 2022 / extension à la région / détermination d'une pollution de fond 2D régionale / mise à jour des modulations des émissions routières, résidentielles, agricoles / prise en compte de spécificités industrielles locales / prise en compte des principaux tunnels routiers et ferroviaires / croisement des populations exposées à partir des populations légales INSEE 2021.
Au-delà des évolutions induites par la météorologie (dispersion, dépôt, transformation des polluants) et par l'apport de pollution exogène aux territoires (embruns, poussières désertiques, etc), les éléments de mises à jour précités peuvent avoir une influence non négligeable dans l'interprétation avec les années antérieures.

Conditions d'utilisation

Atmo Nouvelle-Aquitaine fait partie du dispositif français de surveillance et d'information sur la qualité de l'air. Sa mission s'exerce dans le cadre de la loi sur l'air du 30 décembre 1996 et de ses décrets d'application.
À ce titre et compte tenu de ses statuts, Atmo Nouvelle-Aquitaine est garant de la transparence de l'information sur les résultats de ces travaux selon les règles suivantes :

- Atmo Nouvelle-Aquitaine est libre de leur diffusion selon les modalités de son choix : document papier, communiqué, résumé dans ses publications, mise en ligne sur son site internet (www.atmo-nouvelleaquitaine.org).
- les données contenues dans ce rapport restent la propriété d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. En cas de modification de ce rapport, seul le client sera informé d'une nouvelle version. Tout autre destinataire de ce rapport devra s'assurer de la version à jour sur le site Internet de l'association.
- en cas d'évolution de normes utilisées pour la mesure des paramètres entrant dans le champ d'accréditation d'Atmo Nouvelle-Aquitaine, nous nous engageons à être conforme à ces normes dans un délai de 6 mois à partir de leur date de parution.
- toute utilisation de ce document doit faire référence à Atmo Nouvelle-Aquitaine et au titre complet du rapport.

Atmo Nouvelle-Aquitaine ne peut en aucune façon être tenu responsable des interprétations, travaux intellectuels, publications diverses résultant de ses travaux pour lesquels l'association n'aurait pas donné d'accord préalable. Dans ce rapport, les incertitudes de mesures ne sont pas prises en compte lors de comparaison à un seuil réglementaire.

Validation numérique du document le

Signé par Rémi Feuillade
Le 11/06/2025

Signed with universign

FE028-ETU-V2

En cas de remarques sur les informations ou leurs conditions d'utilisation, prenez contact avec Atmo Nouvelle-Aquitaine :

- depuis le formulaire de contact de notre site Web
- par mail : contact@atmo-na.org
- par téléphone : 09.84.200.100

SOMMAIRE

RÉSUMÉ DE LA QUALITÉ DE L'AIR EN RÉGION 4

Situation vis-à-vis des seuils réglementaires et des recommandations OMS 4

Évolution des concentrations sur 10 ans 4

BILAN RÉGIONAL DE LA QUALITÉ DE L'AIR EN 2024 6

Dioxyde d'azote NO_2 9

Particules grossières PM_{10} 11

Particules fines $PM_{2,5}$ 13

Ozone O_3 15

Dioxyde de soufre SO_2 17

Monoxyde de carbone CO 19

Benzène C_6H_6 20

Benzo(a)pyrène B(a)P 21

Métaux lourds 22

LEXIQUE 23

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 / LES STATIONS DE MESURE FIXE 24

ANNEXE 2 / SEUILS DE QUALITÉ DE L'AIR APPLICABLES 28

ANNEXE 3 / RÉSULTATS DES MESURES FIXES PAR POLLUANT 30

ANNEXE 4 / GÉNÉRALITÉS SUR LES POLLUANTS 36

ANNEXE 5 / MÉTHODES DE MESURE DES POLLUANTS 38

RÉSUMÉ DE LA QUALITÉ DE L'AIR EN RÉGION

Situation vis-à-vis des seuils réglementaires & des recommandations OMS

	Hors influence	Influence trafic	Influence industrielle	Tendance sur 10 ans
NO_2	Non-respect d'au moins 1 recommandation OMS	Non-respect d'au moins 1 recommandation OMS	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	-40% ↘
PM_{10}	Non-respect d'au moins 1 seuil réglementaire	Non-respect d'au moins 1 seuil réglementaire	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	-31% ↘
$PM_{2,5}$	Non-respect d'au moins 1 recommandation OMS	Non-respect d'au moins 1 recommandation OMS	Non-respect d'au moins 1 recommandation OMS	-37% ↘
O_3	Non-respect d'au moins 1 seuil réglementaire	Non concerné	Non concerné	-2% ↘
SO_2	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	Non concerné	Non-respect d'au moins 1 seuil réglementaire	-4% ↘
CO	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	Non concerné	Non concerné	+50% ↗
C_6H_6	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	Non concerné	
B(a)P	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	Non concerné	Non concerné	
As	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	Non concerné	Non concerné	
Cd	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	Non concerné	Non concerné	
Ni	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	Non concerné	Non concerné	
Pb	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	Non concerné	Non concerné	
NO_x	Respect de la réglementation et des recommandations OMS	Non concerné	Non concerné	

Non-respect d'au moins 1 seuil réglementaire

Non-respect d'au moins 1 recommandation OMS

Respect de la réglementation et des recommandations OMS

Non concerné

Évolution des concentrations sur 10 ans



Evolution moyenne 2015-2024 *par polluant*

-31% PM_{10}

-40% NO_2

-37% $PM_{2,5}$

-4% SO_2

-2% O_3

+50% CO

Parce que les concentrations mesurées sont faibles et le nombre de sites de mesure également, la variabilité du CO est forte, sans que cela ne soit inquiétant.

Une tendance à l'amélioration de la qualité de l'air

Une **baisse tendancielle** est observée sur les 10 dernières années. Les mesures de réduction des rejets de polluants engagées à différents niveaux (local, national, européen) et l'intégration de la problématique de l'air dans la réglementation, favorisent la mise en place d'actions en faveur de la qualité de l'air (PCAET, PREPA, PPA ...).

Dioxyde d'azote (NO_2) : concentrations à la baisse depuis 10 ans, diminution plus modérée depuis 2019 mais qui persiste largement.
Ozone (O_3) : les concentrations augmentent depuis 2021, pour diminuer à nouveau légèrement en 2024. De manière globale, depuis 10 ans, les niveaux d'ozone sont à la hausse compte tenu de l'ensoleillement et des températures allant croissants. À noter que 2024 est qualifiée d'année pluvieuse et peu ensoleillée. Ces conditions alors moins propices à la formation de l'ozone expliquent la diminution annuelle observée.
Particules grossières (PM_{10}) : les concentrations montrent une baisse assez marquée par rapport à 2022, en raison de l'absence de feux de forêts qui avaient alors dégradé ponctuellement la qualité de l'air. Hormis ces évènements, la diminution des concentrations se maintient depuis 2015.
Particules fines ($PM_{2,5}$) : les concentrations de 2024 atteignent le niveau le plus bas depuis 10 ans. Après 2 ans d'augmentation en 2021 et 2022, la tendance générale à la baisse des concentrations se poursuit.
Les niveaux pluviométriques excédentaires en moyenne sur la France de 15% participent à réduire les concentrations de particules en suspension en les « rabattant » vers le sol.

La qualité de l'air fluctue plus ou moins selon les années, en raison des rejets de polluants et des conditions météo. Exemples : les activités de chauffage dépendent des températures : un hiver long et froid favorisera le recours au chauffage et donc à des combustibles à l'origine de polluants ; les épandages d'engrais, favorisés par une météo printanière clémente, peuvent induire des émissions de polluants d'origine agricole. Le comportement des masses d'air influence les concentrations mesurées : stables ou perturbées, les polluants s'accumulent (inversions de température, vents faibles, conditions anticycloniques), se dispersent (vents forts, tempêtes) ou sont lessivés (épisodes pluvieux) en conséquence. La chimie atmosphérique et les transports à longue distance de polluants (poussières de sable du Sahara, feux de forêt intenses ...) complètent les causes de variations interannuelles.

BILAN RÉGIONAL DE LA QUALITÉ DE L'AIR EN 2024

Les bases de la surveillance

43 stations fixes dénombrées en 2024 sur le territoire régional
- 27 stations situées en environnement urbain
- 7 stations situées en environnement périurbain
- 9 stations situées en environnement rural

Les stations sont différenciées également par leur influence : trafic routier, industrielle ou de fond (c'est-à-dire, aucune influence directe, nous utilisons le terme « hors influence »).

Il faut signaler qu'en complément du réseau de mesure fixe, **l'intégralité de la région est couverte par des outils de modélisation (simulation numérique de la qualité de l'air)** qui apportent des informations complémentaires, en particulier sur d'éventuels dépassements localisés de seuils réglementaires. Ces informations sont disponibles dans les bilans départementaux.

connaître le dispositif de mesure fixe > annexe 1

techniques de mesure et accréditation Cofrac > annexe 5

Les seuils de qualité de l'air

Les données de concentrations sont issues du réseau fixe de mesure. Ces valeurs sont commentées par rapport aux seuils réglementaires et aux recommandations de l'OMS en vigueur qui leurs sont applicables. Conformément aux consignes de la Commission européenne, les dépassements répertoriés dans ce bilan sont uniquement ceux observés par la mesure ; les dépassements estimés par la modélisation sont donnés à titre indicatif.

Exposition chronique : valeur limite, valeur cible, valeur critique, objectif de qualité et recommandations OMS

Exposition aiguë : seuil d'alerte et seuil d'information-recommandations

Certains seuils visent la **protection de la santé**, d'autres celle des **écosystèmes**.

tout sur la réglementation > annexe 2

Stations de mesure fixe en service en 2024



La qualité de l'air : son origine dans les émissions

Les émissions sont les quantités de polluants rejetés par les activités humaines et naturelles. L'origine des polluants est variée et dépend des activités présentes sur un territoire. La qualité de l'air respiré par chacun dépend de ces émissions, mais pas seulement. D'autres facteurs interviennent dans les niveaux de pollution mesurés (= les concentrations) : paramètres météo et transformations physico-chimiques en sont les principaux.



Exposition chronique de tous les jours : l'ozone continue de dépasser l'objectif de qualité



ML : Métaux Lourds

Non-respect d'au moins 1 valeur limite

Non-respect d'au moins 1 valeur cible, 1 objectif de qualité

Non-respect d'au moins 1 recommandation OMS

Respect de la réglementation et des recommandations OMS

Non concerné

à respecter

à respecter dans la mesure du possible

Épisodes de pollution, indicateurs de l'exposition aiguë

C'est quoi ?

Un épisode de pollution est caractérisé lorsque plusieurs critères spécifiques sont réunis. Il faut qu'un dépassement de seuil réglementaire (SIR / seuil d'information-recommandations ou SAL / seuil d'alerte) soit prévu (ou effectif) et qu'il affecte une certaine surface du territoire et/ou un certain nombre d'habitants. Le dépassement est identifié à l'aide de simulations numériques représentant la qualité de l'air au jour le jour. Ces dernières calculent les concentrations de polluants sur toute la région. C'est ainsi que le type de dépassement et le polluant sont identifiés, et que les critères de nombre d'habitants et de surfaces exposés sont vérifiés. Ces seuils et critères sont définis par arrêtés préfectoraux. Les pics de pollution dont il est question présentent alors un risque sur une courte durée pour la santé humaine.

4 polluants

Quatre polluants sont concernés : particules grossières, ozone, dioxyde d'azote et dioxyde de soufre. Les zones visées par les épisodes de pollution dépendent du polluant ciblé : échelle départementale, urbaine ou zone industrielle.

Ce bilan comptabilise les épisodes de pollution à l'échelle de la journée et par territoire. *Un même jour d'épisode de pollution identifié sur différents territoires est comptabilisé autant de fois que de territoires.*

0 journée

Aucune journée n'a connu d'épisode de pollution en 2024.

La survenue et la fréquence des épisodes de pollution sont très dépendantes des conditions météorologiques (dépression atmosphérique, situation anticyclonique, canicule, pluie, tempête). Ces dernières peuvent être propices ou défavorables à l'accumulation des polluants et donc à un épisode de pollution ou non. Chaque année est unique et 2024 ne déroge pas à la règle.

ÉPISODES DE POLLUTION

● Pas d'épisode

GLOSSAIRE

SIR : Seuil d'Information-Recommandations
SAL : Seuil d'ALerte

DIOXYDE D'AZOTE NO_2

Sources de pollution régionales

par polluant et par secteur d'activité



50%

proviennent du transport routier

Source : inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine 2022 – ICARE v3.2.4

État de la qualité de l'air

par rapport aux seuils

	au global	hors influence	influence trafic	influence industrielle
Valeur limite annuelle 40 µg/m³	✓	✓	✓	✓
Valeur limite horaire 200 µg/m³	✓	✓	✓	✓
Seuil d'info-reco 200 µg/m³ horaire	✓	✓	✓	✓
Seuil d'alerte 400 µg/m³ horaire	✓	✓	✓	✓
Recommandations OMS 10 µg/m³/an	✗	✗ 5	✗ 9	✓
3 jours 25 µg/m³	✗	✗ 10	✗ 10	✓
200 µg/m³ horaire	✓	✓	✓	✓
Nombre de stations		23	10	4

✓ Seuil respecté

✗ Seuil non respecté

2 Nombre de stations en non-respect

tous les résultats détaillés > annexe 3

Concentrations moyennes annuelles
par station et typologie

10 µg/m³
Recommandation OMS annuelle non respectée

40 µg/m³
Valeur limite annuelle respectée



Tendance d'évolution
par typologie



-34% Rural hors influence

-43% Périurbain hors influence

-40% Urbain hors influence

-34% Industrielle

-43% Trafic

-40% concentrations moyennes toutes typologies de stations

PARTICULES GROSSIÈRES PM_{10}

Sources de pollution régionales

par polluant et par secteur d'activité



multisource

chauffage, agriculture, industries, transport routier

Source : inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine 2022 – ICARE v3.2.4

État de la qualité de l'air

par rapport aux seuils

	au global	hors influence	influence trafic	influence industrielle
Valeur limite annuelle 40 µg/m³	✓	✓	✓	✓
Valeur limite journalière 50 µg/m³	✓	✓	✓	✓
Objectif de qualité 30 µg/m³ annuel	✓	✓	✓	✓
Seuil d'info-reco 50 µg/m³/j	✗	✗ 3	✗ 6	✓
Seuil d'alerte 80 µg/m³/j	✓	✓	✓	✓
Recommandations OMS 15 µg/m³/an	✗	✗ 3	✗ 4	✓
3 jours 45 µg/m³	✗	✓	✗ 2	✓
Nombre de stations		23	10	3

✓ Seuil respecté

✗ Seuil non respecté

2 Nombre de stations en non-respect

tous les résultats détaillés > annexe 3

Concentrations moyennes annuelles

par station et typologie

30 µg/m³
Objectif de qualité respecté

40 µg/m³
Valeur limite annuelle respectée



Tendance d'évolution

par typologie

PM_{10} / Évolution moyenne 2015-2024 ***par typologie de stations***



-28% Rural hors influence

-18% Périurbain hors influence

-34% Urbain hors influence

-33% Industrielle

-32% Trafic

-31% concentrations moyennes toutes typologies de stations

PARTICULES FINES $PM_{2,5}$

Sources de pollution régionales

par polluant et par secteur d'activité



72% *proviennent des activités résidentielles et tertiaires*

Source : inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine 2022 – ICARE v3.2.4

État de la qualité de l'air

par rapport aux seuils



tous les résultats détaillés > annexe 3

Concentrations moyennes annuelles
par station et typologie

25 µg/m³
Valeur limite annuelle respectée

10 µg/m³
Objectif de qualité respecté



Tendance d'évolution
par typologie



$PM_{2,5}$ / Évolution moyenne 2015-2024 ***par typologie de stations***

-14% Rural hors influence
2020-2024

-44% Périurbain hors influence
2016-2024

-28% Urbain hors influence

-30% Industrielle

-53% Trafic

-34% concentrations moyennes toutes typologies de stations

OZONE O_3

État de la qualité de l'air
par rapport aux seuils

Seuil respecté

Seuil non respecté

2 Nombre de stations en non-respect

	hors influence santé	hors influence végétation
Valeur cible 120 µg/m³ sur 3 ans	✓	
Objectif de qualité 120 µg/m³	✗ 6	
Seuil d'info-reco 180 µg/m³ horaire	✓	
Seuils d'alerte	✓	
Recommandations OMS pic saisonnier 60 µg/m³	✗ 26	
Recommandations OMS 3 jours 100 µg/m³/8h	✗ 23	
Valeur cible AOT 40 sur 5 ans		✓
Objectif de qualité AOT 40 sur 1 an		✓
Nombre de stations	26	9

tous les résultats détaillés > annexe 3

Objectif de qualité pour la santé
par station

120 µg/m³/8h
Objectif de qualité non respecté ✗

+25 jours sur 3 ans
Valeur cible respectée ✓



Tendance d'évolution
par typologie



Ozone / Évolution moyenne 2015-2024 ***par typologie de stations***

-9% Rural hors influence

-2% Périurbain hors influence

0% Urbain hors influence

-2% concentrations moyennes toutes typologies de stations

DIOXYDE DE SOUFRE SO_2

Sources de pollution régionales

par polluant et par secteur d'activité



71% *proviennent du secteur industriel*

Source : inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine 2022 – ICARE v3.2.4

État de la qualité de l'air

par rapport aux seuils



tous les résultats détaillés > annexe 3

Maximum horaire
par station et typologie



300 µg/m³

Seuil d'information et de recommandations dépassé

Tendance d'évolution
par typologie



SO_2 / Evolution moyenne 2015-2024 ***par typologie de stations***

0 % Urbain hors influence

-4 % Industrielle

-4% concentrations moyennes toutes typologies de stations

MONOXYDE DE CARBONE CO

Sources de pollution régionales

par polluant et par secteur d'activité

80% *proviennent des activités résidentielles et tertiaires*

Source : inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine 2022 – ICARE v3.2.4

État de la qualité de l'air

par rapport aux seuils



Respect

de tous les seuils

depuis 2010

Valeur limite respectée

tous les résultats détaillés > annexe 3

BENZÈNE C_6H_6

Sources de pollution régionales

par polluant et par secteur d'activité

84% ***proviennent des activités résidentielles et tertiaires***

Source : inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine 2022 – ICARE v3.2.4

État de la qualité de l'air

par rapport aux seuils

	au global	hors influence	influence trafic
Valeur limite 5 µg/m³ annuel	✓	✓	✓
Objectif de qualité 2 µg/m³ annuel	✓	✓	✓
Nombre de stations		1	1

Respect

de tous les seuils

✓ Seuil respecté ⊗ Seuil non respecté 2 Nombre de stations en non-respect

Moyennes annuelles

par station et typologie

5 µg/m³

Valeur limite respectée

2 µg/m³

Objectif de qualité respecté

BENZO(a)PYRÈNE B(a)P

Sources de pollution régionales

par polluant et par secteur d'activité

78%

proviennent des activités domestiques et tertiaires

Source : inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine 2022 – ICARE v3.2.4

État de la qualité de l'air

par rapport aux seuils

Seuil respecté

Seuil non respecté

2 Nombre de stations en non-respect

1 ng/m³

Valeur cible respectée

Moyennes annuelles

Respect depuis 2010

de la valeur cible

MÉTAUX LOURDS

Sources de pollution régionales

par polluant et par secteur d'activité

Arsenic



1ers émetteurs

transport routier et activités résidentielles

Cadmium



55%

des émissions proviennent des industries

Nickel



55%

des émissions proviennent des industries

Plomb



60%

des émissions proviennent du transport routier

Source : inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine 2022 – ICARE v3.2.4

État de la qualité de l'air

par rapport aux seuils



respect depuis 2010

de tous les seuils réglementaires et recommandation OMS

Seuil respecté

Seuil non respecté

2 Nombre de stations en non-respect

LEXIQUE

Polluants

As	arsenic
B(a)P	benzo(a)pyrène
C_6H_6	benzène
Cd	cadmium
CO	monoxyde de carbone
COV(NM)	composés organiques volatils (non méthaniques)
Ni	nickel
NO	monoxyde d'azote
NO_2	dioxyde d'azote
NO_X	oxydes d'azote (= dioxyde d'azote + monoxyde d'azote)
O_3	ozone
Pb	plomb
PM	particules en suspension (particulate matter)
PM_{10}	particules grossières de diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm
$PM_{2,5}$	particules fines de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 µm
SO_2	dioxyde de soufre

Unités de mesure

µg	microgramme (= 1 millionième de gramme = 10-6 g)
mg	milligramme (= 1 millième de gramme = 10-3 g)
ng	nanogramme (= 1 milliardième de gramme = 10-9 g)

Sigles et acronymes

AASQA	association agréée de surveillance de la qualité de l'air
AOT40	accumulated exposure over threshold 40
LCSQA	laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air
MERA	dispositif national de suivi sur le long terme de la pollution atmosphérique longue distance et transfrontalière, faisant partie du dispositif européen EMEP (European Monitoring and Evaluation Program)
OMS	organisation mondiale de la santé
PCAET	plan climat air énergie territorial
PPA	plan de protection de l'atmosphère
PREPA	plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques

Autre définition

année civile : période allant du 1er janvier au 31 décembre

ANNEXE 1 / LES STATIONS DE MESURE FIXE

Classification des stations de mesure

L'ensemble des stations fixes du dispositif de surveillance de la qualité de l'air en Nouvelle-Aquitaine est classifié selon les recommandations nationales décrites dans un guide rédigé par le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de l'Air (LCSQA)[4]. Révisé en février 2017 il tient compte de l'évolution du contexte législatif et normatif, afin de disposer d'un référentiel national sur la macro et la micro-implantation des points de mesure qui soit conforme aux exigences et aux recommandations des textes européens en vigueur ainsi qu'aux contraintes techniques issues des normes émises par le Comité Européen de Normalisation (CEN). Ce guide définit notamment des critères de classification pour chaque polluant mesuré, selon deux paramètres :

- L'environnement d'implantation de la station
- Le type d'influence prédominante du polluant en question

Environnement d'implantation relatif à la station

Chaque station de mesure peut prendre les caractéristiques suivantes selon son environnement d'implantation :

- Station urbaine
- Station périurbaine
- Station rurale :
    - proche de zone urbaine
    - régionale
    - nationale

Cette classification tient compte, notamment, des éléments suivants : population environnante, typologie des bâtiments alentours, occupation du sol.

Une station appartient obligatoirement à un et un seul type d'environnement d'implantation.

Type d'influence prédominante relatif au polluant

Au sein de chaque station, l'ensemble des mesures est ensuite classé selon l'influence prédominante concernant le polluant :

- influence industrielle : i
- influence du trafic : T
- influence de fond (« hors influence ») : F

L'influence sous laquelle est réalisée la mesure d'un polluant tient compte, quant à elle, des sources d'émissions à proximité de la station : types de sources, composés émis, quantités, distance à la station...

Une station mesurant plusieurs polluants peut donc cumuler plusieurs types d'influence.

[4] « Conception, implantation et suivi des stations françaises de surveillance de la qualité de l'air », LCSQA, février 2017

Stations de mesure fixe de qualité de l'air opérationnelles en 2024 en Nouvelle-Aquitaine

Polluants mesurés et influence
F = fond T = trafic i = industrielle

Département	n° dép.	Nom station	Implantation	*NO_2	*NOx	*PM_{10}	*$PM_{2,5}$	*O_3	*SO_2	*CO	C_6H_6	Métaux lourds				B(a)P
												Pb	As	Cd	Ni	
Charente	16	Angoulême centre	Urbaine	F		F	F	F								
		Angoulême - Gambetta	Urbaine	T		T										
Charente-Maritime	17	Aytré	Périurbaine	F		F		F								
		La Rochelle - La Pallice	Urbaine			i	i									
		La Rochelle centre	Urbaine	F		F	F	F								
Corrèze	19	Brive-la-Gaillarde	Urbaine	F		F		F								
		Tulle	Urbaine	F		F		F								
Creuse	23	MERA	Rurale Nationale					F								
		Guéret	Urbaine	F		F		F			F	F	F	F	F	
Dordogne	24	Périgueux	Urbaine	F		F	F	F								
Gironde	33	Ambès	Périurbaine	i				F								
		Le Temple	Rurale Régionale	F	F			F								
		Bordeaux - Grand Parc	Urbaine	F		F		F								
		Talence	Urbaine	F		F	F	F								F
		Floirac - Branne	Urbaine	T		T										
		Bordeaux - Gautier	Urbaine	T		T	T				T					
		Mérignac	Urbaine	T		T										
		Bassens	Urbaine	F		F	F	F	i							
Landes	40	Mont-de-Marsan - Midouze	Urbaine	F		F	F	F								
		Tartas Pelletrin	Périurbaine			i			i							
Lot-et-Garonne	47	Marmande	Périurbaine	T		T	T									
Pyrénées-Atlantiques	64	Biarritz - Hippodrome	Périurbaine	F		F	F	F								
		Bayonne - Saint-Crouts	Urbaine	F		F		F								
		Anglet - BAB	Urbaine	T		T	T									
		ZI Lacq - Lacq	Rurale Proche	i					i							
		ZI Lacq - Labastide-Cézeracq	Rurale Proche	F		F		F	i							
		ZI Lacq - Lagor	Rurale Proche						i							
		ZI Lacq - Maslacq	Rurale Proche						i							
		ZI Lacq - Mourenx	Rurale Proche	i					i							
		Billère	Urbaine	F		F	F	F								
		Pau - Tourasse	Urbaine	T		T										
Deux-Sèvres	79	Airvault - Stade Laillé	Périurbaine	F		F		F	i							
		Forêt Chizé Zoodyssée	Rurale Régionale	F	F	F	F	F								
		Niort - Venise Verte	Urbaine	F		F	F	F								
		Niort - Tassigny	Urbaine	T		T										
Vienne	86	Poitiers - Couronneries	Urbaine	F		F		F								
		Poitiers - Le Nain	Urbaine	T		T										
		Poitiers centre	Urbaine	F		F	F	F		F						
Haute-Vienne	87	Le Palais-sur-Vienne	Périurbaine			F	F	F								
		Saillat-sur-Vienne	Rurale Proche	i		i			i							
		Saint-Junien	Urbaine	F		F		F	F							
		Limoges - Berland	Urbaine	F		F	F	F								
		Limoges - Aine	Urbaine	T		T										

* Polluants sous accréditation (accréditation Cofrac n° 1-6354, portée disponible sur www.cofrac.fr).

Évolutions des stations en 2024 : fermeture de *Bordeaux - Bastide* (influence trafic) et ouverture de *Floirac - Branne* (influence trafic) en remplacement.
Ajout de la mesure de $PM_{2,5}$ à *Anglet - BAB* en décembre (influence trafic) et au *Palais-sur-Vienne* en novembre (hors influence), mais la mesure étant insuffisante pour l'année civile 2024, aucun indicateur n'est disponible.

Fond équivaut à « hors influence ».

Stations de mesure fixe | Dioxyde d'azote NO_2



Stations de mesure fixe
par influence

23 hors influence
10 trafic
6 industrielle

Stations de mesure fixe | Ozone O_3



Stations de mesure fixe
par influence

26 hors influence

Stations de mesure fixe | Particules grossières PM_{10}



Stations de mesure fixe
par influence

23 hors influence
10 trafic
4 industrielle

Stations de mesure fixe | Particules fines $PM_{2,5}$



Stations de mesure fixe
par influence

13 hors influence
3 trafic
2 industrielle

Stations de mesure fixe

Dioxyde de soufre SO_2



Stations de mesure fixe
par influence
1 hors influence
7 industrielle

Stations de mesure fixe

Benzène C_6H_6

Stations de mesure fixe
par influence
1 hors influence
1 trafic



Stations de mesure fixe
par influence
1 hors influence

Stations de mesure fixe

Monoxyde de carbone CO

Stations de mesure fixe

Benzo(a)pyrène B(a)P



Stations de mesure fixe
par influence
1 hors influence

Stations de mesure fixe

Métaux lourds

Stations de mesure fixe
par influence
1 hors influence

ANNEXE 2 / SEUILS RÉGLEMENTAIRES & RECOMMANDATIONS DE L'OMS APPLICABLES À L'AIR AMBIANT

	Polluant et nature des seuils	Mode de calcul (décret n° 2010-1250 du 21/10/10 et site web de l'OMS pour les valeurs guides 2021)
OZONE (O_3)		
Pollution aiguë	**Seuils d'alerte (SAL)**	**240 µg/m³** pour la valeur moyenne **horaire** sur **3 heures consécutives** **300 µg/m³** pour la valeur moyenne **horaire** sur **3 heures consécutives** **360 µg/m³** pour la valeur moyenne **horaire**
	Seuil d'information et de recommandations (SIR)	**180 µg/m³** pour la valeur moyenne **horaire**
Pollution chronique	**Objectif de qualité** (Protection de la santé)	**120 µg/m³** pour la valeur maximale journalière sur **8 heures**
	Valeur cible (Protection de la santé)	**120 µg/m³** pour la valeur maximale sur **8 heures** en moyenne sur 3 ans à ne pas dépasser plus de 25 fois
	Recommandation OMS	**3 dépassements autorisés du seuil de 100 µg/m³** pour la valeur maximale journalière sur **8 heures**
	Recommandation OMS	**60 µg/m³** pour la valeur maximale journalière sur 8 heures en moyenne sur 6 mois consécutifs où les valeurs sont les plus élevées (pic saisonnier)
	Objectif de qualité (Protection de la végétation)	**AOT 40** de mai à juillet de 8h à 20h : **6000** µg/m³ par heure
	Valeur cible (Protection de la végétation)	**AOT 40** de mai à juillet de 8h à 20h : **18 000** µg/m³ par heure en moyenne sur 5 ans
DIOXYDE D'AZOTE (NO_2)		
Pollution aiguë	**Seuil d'alerte (SAL)**	**400 µg/m³** pour la valeur **horaire** sur **3 heures consécutives** (ou **200 µg/m³** si « SIR » déclenché la veille et le jour même et si risque de dépassement pour le lendemain)
	Seuil d'information et de recommandations (SIR)	**200 µg/m³** pour la valeur moyenne **horaire**
Pollution chronique	**Valeurs limites**	**200 µg/m³** pour la valeur moyenne **horaire** à ne pas dépasser plus de 18 fois par an **40 µg/m³** pour la moyenne **annuelle**
	Recommandations OMS	**200 µg/m³** pour la valeur moyenne **horaire** **3 dépassements autorisés du seuil de 25 µg/m³** pour la valeur moyenne journalière **10 µg/m³** pour la moyenne **annuelle**
OXYDES D'AZOTE (NOx)		
Pollution chronique	**Niveau critique (NOx)**	**30 µg/m³** pour la moyenne **annuelle (protection de la végétation)**
DIOXYDE DE SOUFRE (SO_2)		
Pollution aiguë	**Seuil d'alerte (SAL)**	**500 µg/m³** pour la valeur **horaire** sur **3 heures consécutives**
	Seuil d'information et de recommandations (SIR)	**300 µg/m³** pour la valeur moyenne **horaire**
Pollution chronique	**Valeurs limites**	**350 µg/m³** pour la valeur moyenne **horaire** à ne pas dépasser plus de 24 fois par an **125 µg/m³** pour la valeur moyenne **journalière** à ne pas dépasser plus de 3 fois par an
	Objectif de qualité	**50 µg/m³** pour la moyenne **annuelle**
	Recommandation OMS	**3 dépassements autorisés du seuil de 40 µg/m³** pour la valeur moyenne **journalière**
	Niveaux critiques (protection de la végétation)	**20 µg/m³** pour la moyenne **annuelle** **20 µg/m³** pour la moyenne **hivernale** (du 1/10 au 31/03)
PARTICULES GROSSIÈRES (PM_{10})		
Pollution aiguë	**Seuil d'alerte (SAL)**	**80 µg/m3** pour la valeur moyenne **journalière**
	Seuil d'information et de recommandations (SIR)	**50 µg/m³** pour la valeur moyenne **journalière**
Pollution chronique	**Valeurs limites**	**50 µg/m³** pour la valeur moyenne **journalière** à ne pas dépasser plus de 35 fois par an **40 µg/m³** pour la moyenne **annuelle**
	Objectif de qualité	**30 µg/m³** pour la moyenne **annuelle**
	Recommandations OMS	**15 µg/m³** pour la moyenne **annuelle** **3 dépassements autorisés** du seuil de **45 µg/m³** en moyenne **journalière**

	Polluant et nature des seuils	Mode de calcul (décret n° 2010-1250 du 21/10/10 et site web de l'OMS pour les valeurs guides 2021)
PARTICULES FINES ($PM_{2,5}$)		
Pollution chronique	**Valeur limite**	**25 µg/m³** pour la moyenne **annuelle**
	Valeur cible	**20 µg/m³** pour la moyenne **annuelle**
	Objectif de qualité	**10 µg/m³** pour la moyenne **annuelle**
	Recommandations OMS	**5 µg/m³** pour la moyenne **annuelle** **3 dépassements autorisés** du seuil de **15 µg/m³** en moyenne **journalière**
PLOMB (Pb), ARSENIC (As), CADMIUM (Cd), NICKEL (Ni)		
Pollution chronique	**Valeur limite**	**0,5 µg/m³** (Pb) pour la moyenne **annuelle**
	Objectif de qualité	**0,25 µg/m³** (Pb) pour la moyenne **annuelle**
	Valeurs cibles	**6 ng/m³** (As), **5 ng/m³** (Cd), **20 ng/m³** (Ni) pour la moyenne **annuelle**
	Recommandation OMS	**0,5 µg/m³** (Pb) pour la moyenne **annuelle**
MONOXYDE DE CARBONE (CO)		
Pollution chronique	**Valeur limite**	**10 mg/m³** pour la valeur moyenne sur **8 heures**
	Recommandations OMS	**3 dépassements autorisés** du seuil de **4 mg/m³** en moyenne journalière **10 mg/m³** pour la valeur moyenne sur **8 heures** **35 mg/m³** pour la valeur moyenne **horaire**
BENZÈNE (C_6H_6)		
Pollution chronique	**Valeur limite**	**5 µg/m³** pour la moyenne **annuelle**
	Objectif de qualité	**2 µg/m³** pour la moyenne **annuelle**
BENZO(a)PYRÈNE		
Pollution chronique	**Valeur cible**	**1 ng/m³** pour la moyenne **annuelle**

Seuils réglementaires de qualité de l'air et recommandations OMS

- **AOT40 :** indicateur spécifique à l'ozone, exprimé en µg/m³.heure, calculé en effectuant la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ et le seuil de 80 µg/m³ durant une période donnée en utilisant uniquement les valeurs sur 1 heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures (pour l'ozone : 40 ppb ou partie par milliard=80 µg/m³)
- **objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir**, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble
- valeur critique ou niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les autres plantes ou écosystèmes naturels, à l'exclusion des êtres humains
- **recommandations de l'OMS :** l'OMS (organisation mondiale de la santé) **recommande des niveaux d'exposition** (concentrations et durées) en-dessous desquels il n'a pas été observé d'effets nuisibles sur la santé humaine ou sur la végétation. Les valeurs présentées dans ce document sont celles relatives à une durée d'exposition comprise entre une heure et une année
- **seuil d'alerte (SAL) :** niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence
- **seuil d'information et de recommandations (SIR) :** niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l'émission d'informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines émissions
- **valeur cible** (en air extérieur) **: niveau à atteindre dans la mesure du possible** dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble
- **valeur limite : niveau à atteindre** dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ; c'est donc un seuil contraignant

Les épisodes de pollution sont caractérisés par le biais de simulations. Les critères d'identification d'un épisode de pollution sont notamment des critères de population exposée et de surface impactée par un dépassement du seuil d'information-recommandations ou du seuil d'alerte. La gestion des épisodes de pollution s'appuie principalement sur 3 arrêtés ministériels :

- l'arrêté du 7 avril 2016 modifié relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant
- l'arrêté du 26 août 2016 modifiant l'arrêté du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant précise les modalités d'application (cet arrêté est décliné par département dans des arrêtés préfectoraux)
- l'arrêté du 13 mars 2018 modifiant l'arrêté du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de prévenir les effets de la pollution de l'air sur la santé, pris en application de l'article R. 221-4 du code de l'environnement

ANNEXE 3 / RÉSULTATS DES MESURES FIXES PAR POLLUANT

Chaque case colorée signifie qu'un dépassement de seuil réglementaire ou de recommandation OMS est constaté. Un dépassement de seuil est constaté si et seulement si la concentration est strictement supérieure au seuil, et non pas égale au seuil.

Particules grossières PM_{10}

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	moy. annuelle	max. journalier	nb. jours > 50 µg/m³	nb. jours > 45 µg/m³
16	Angoulême centre	Hors influence	Urbaine	11	49	0	2
	Angoulême - Gambetta	Trafic	Urbaine	16	55	1	2
17	La Rochelle centre	Hors influence	Urbaine	14	39	0	0
	Aytré	Hors influence	Périurbaine	16	44	0	0
	La Rochelle - La Pallice	Industrielle	Urbaine	15	47	0	1
19	Brive-la-Gaillarde	Hors influence	Urbaine	14	37	0	0
	Tulle	Hors influence	Urbaine	10	29	0	0
23	Guéret	Hors influence	Urbaine	9	44	0	0
24	Périgueux	Hors influence	Urbaine	12	38	0	0
33	Bordeaux - Grand Parc	Hors influence	Urbaine	16	51	1	2
	Talence	Hors influence	Urbaine	13	59	1	1
	Floirac - Branne	Trafic	Urbaine	15	50	0	1
	Mérignac	Trafic	Urbaine	15	53	1	2
	Bassens	Hors influence	Urbaine	13	50	0	2
	Bordeaux - Gautier	Trafic	Urbaine	18	71	3	4
40	Tartas Pelletrin	Industrielle	Périurbaine	13	36	0	0
	Mont-de-Marsan - Midouze	Hors influence	Urbaine	13	43	0	0
47	Marmande	Trafic	Périurbaine	14	34	0	0
64	Billère	Hors influence	Urbaine	12	56	1	1
	Bayonne - St-Crouts	Hors influence	Urbaine	14	42	0	0
	Anglet - BAB	Trafic	Urbaine	19	64	2	5
	Pau - Tourasse	Trafic	Urbaine	15	54	2	2
	Biarritz - Hippodrome	Hors influence	Périurbaine	17	48	0	3
	ZI Lacq - Labastide-Cézéracq	Hors influence	Rurale Proche	11	44	0	0
79	Niort - Venise Verte	Hors influence	Urbaine	11	36	0	0
	Niort - Tassigny	Trafic	Urbaine	15	42	0	0
	Forêt Chizé Zoodyssée	Hors influence	Rurale Régionale	11	38	0	0
	Airvault - Stade Laillé	Hors influence	Périurbaine	13	48	0	1
86	Poitiers Couronneries	Hors influence	Urbaine	10	40	0	0
	Poitiers - Le Nain	Trafic	Urbaine	20	52	2	2
	Poitiers centre	Hors influence	Urbaine	12	47	0	1
87	Saint-Junien	Hors influence	Urbaine	9	38	0	0
	Le Palais-sur-Vienne	Hors influence	Périurbaine	12	30	0	0
	Saillat-sur-Vienne	Industrielle	Rurale Proche	11	46	0	1
	Limoges - Aine	Trafic	Urbaine	11	28	0	0
	Limoges - Berland	Hors influence	Urbaine	10	33	0	0



Particules fines $PM_{2,5}$

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	moy. annuelle	nb. jours > 15 µg/m³
16	Angoulême centre	Hors influence	Urbaine	7	16
17	La Rochelle centre	Hors influence	Urbaine	6	9
	La Rochelle - La Pallice	Industrielle	Urbaine	7	13
24	Périgueux	Hors influence	Urbaine	8	25
33	Talence	Hors influence	Urbaine	8	30
	Bassens	Hors influence	Urbaine	9	37
	Bordeaux - Gautier	Trafic	Urbaine	8	25
40	Mont-de-Marsan - Midouze	Hors influence	Urbaine	9	34
47	Marmande	Trafic	Périurbaine	6	20
64	Billère	Hors influence	Urbaine	8	33
	Biarritz - Hippodrome	Hors influence	Périurbaine	5	4
79	Niort - Venise Verte	Hors influence	Urbaine	7	19
	Forêt Chizé Zoodyssée	Hors influence	Rurale Régionale	6	13
86	Poitiers centre	Hors influence	Urbaine	8	20
87	Limoges - Berland	Hors influence	Urbaine	7	20

Exposition chronique	Valeur limite	25 µg/m³	
	Valeur cible	20 µg/m³	
	Objectif de qualité	10 µg/m³	
	Recommandations OMS	5 µg/m³	3 j max

Oxydes d'azote NO_x

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	moy. annuelle*
33	Le Temple	Hors influence	Rurale Régionale	3
79	Forêt Chizé Zoodyssée	Hors influence	Rurale Régionale	2

Exposition chronique	Valeur critique	30 µg/m³ eq. NO_2

* Valeur réglementaire pour la protection des écosystèmes, calculée uniquement sur les sites ruraux régionaux ou nationaux hors influence (de fond).

Dioxyde d'azote NO_2

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	moy. annuelle	max. horaire	nb. heures > 200 µg/m³	nb. jours > 25 µg/m³
16	Angoulême centre	Hors influence	Urbaine	11	80	0	3
	Angoulême - Gambetta	Trafic	Urbaine	18	124	0	65
17	La Rochelle centre	Hors influence	Urbaine	11	67	0	5
	Aytré	Hors influence	Périurbaine	6	57	0	0
19	Brive-la-Gaillarde	Hors influence	Urbaine	10	67	0	6
	Tulle	Hors influence	Urbaine	8	52	0	0
23	Guéret	Hors influence	Urbaine	7	78	0	6
24	Périgueux	Hors influence	Urbaine	7	64	0	0
33	Bordeaux - Grand Parc	Hors influence	Urbaine	10	67	0	8
	Talence	Hors influence	Urbaine	11	69	0	11
	Floirac - Branne	Trafic	Urbaine	19	119	0	95
	Mérignac	Trafic	Urbaine	15	79	0	28
	Bassens	Hors influence	Urbaine	10	118	0	7
	Ambès	Industrielle	Périurbaine	5	68	0	0
	Bordeaux - Gautier	Trafic	Urbaine	26	87	0	165
	Le Temple	Hors influence	Rurale Régionale	2	42	0	0
40	Mont-de-Marsan - Midouze	Hors influence	Urbaine	7	53	0	0
47	Marmande	Trafic	Périurbaine	11	79	0	4
64	Billère	Hors influence	Urbaine	9	74	0	6
	Bayonne - Saint-Crouts	Hors influence	Urbaine	10	108	0	8
	Anglet - BAB*	Trafic	Urbaine	-	83	-	32
	Pau - Tourasse	Trafic	Urbaine	17	100	0	48
	Biarritz - Hippodrome	Hors influence	Périurbaine	8	69	0	0
	ZI Lacq - Lacq	Industrielle	Rurale Proche	7	62	0	1
	ZI Lacq - Labastide-Cézéracq	Hors influence	Rurale Proche	6	54	0	0
	ZI Lacq - Mourenx	Industrielle	Rurale Proche	4	42	0	0
79	Niort - Venise Verte	Hors influence	Urbaine	6	51	0	0
	Niort - Tassigny	Trafic	Urbaine	20	96	0	69
	Airvault - Stade Laillé	Hors influence	Périurbaine	5	56	0	0
	Forêt Chizé Zoodyssée	Hors influence	Rurale Régionale	1	34	0	0
86	Poitiers Couronneries	Hors influence	Urbaine	7	67	0	2
	Poitiers - Le Nain	Trafic	Urbaine	23	86	0	120
	Poitiers centre	Hors influence	Urbaine	11	84	0	8
87	Saint-Junien	Hors influence	Urbaine	4	51	0	0
	Saillat-sur-Vienne	Industrielle	Industrielle	5	37	0	0
	Limoges - Aine	Trafic	Urbaine	20	102	0	91
	Limoges - Berland	Hors influence	Urbaine	12	86	0	14



* Le critère de validité de la statistique n'est pas respecté pour la station *Anglet - BAB*, ainsi certains indicateurs ne sont pas disponibles.

Ozone O_3 / protection de la santé

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	max. horaire	max. de la moy. sur 8 heures	nb. j. >100 µg/m³ sur 8h	nb. j. >120 µg/m³ sur 8h (moy. 3 ans)	pic saisonnier moy. jour max. sur 8h
16	Angoulême centre	Hors influence	Urbaine	113	103	2	2	73
17	La Rochelle centre	Hors influence	Urbaine	118	110	5	1	76
	Aytré	Hors influence	Périurbaine	118	112	7	5	80
19	Brive-la-Gaillarde	Hors influence	Urbaine	118	110	16	3	80
	Tulle	Hors influence	Urbaine	119	115	16	3	81
23	Guéret	Hors influence	Urbaine	121	115	5	6	79
	MERA	Hors influence	Rurale Nationale	122	115	18	0	83
24	Périgueux	Hors influence	Urbaine	120	114	17	4	83
33	Bordeaux - Grand Parc	Hors influence	Urbaine	150	135	18	9	83
	Talence	Hors influence	Urbaine	138	128	14	4	82
	Bassens	Hors influence	Urbaine	137	124	10	5	81
	Ambès	Hors influence	Périurbaine	139	120	12	7	81
	Le Temple	Hors influence	Rurale Régionale	139	125	11	7	78
40	Mont-de-Marsan - Midouze	Hors influence	Urbaine	127	118	6	0	75
64	Billère	Hors influence	Urbaine	143	132	28	9	87
	Bayonne - Saint-Crouts	Hors influence	Urbaine	121	110	8	3	81
	Biarritz - Hippodrome	Hors influence	Périurbaine	123	114	24	3	85
	ZI Lacq - Labastide-Cézéracq	Hors influence	Rurale Proche	149	128	13	7	81
79	Niort - Venise Verte	Hors influence	Urbaine	121	112	9	7	79
	Airvault - Stade Laillé	Hors influence	Périurbaine	113	108	5	7	75
	Forêt Chizé Zoodyssée	Hors influence	Rurale Régionale	119	107	2	5	75
86	Poitiers Couronneries	Hors influence	Urbaine	119	115	11	7	80
	Poitiers centre	Hors influence	Urbaine	113	109	2	3	74
87	Le Palais-sur-Vienne	Hors influence	Périurbaine	123	117	16	5	82
	Saint-Junien	Hors influence	Urbaine	130	113	16	6	82
	Limoges - Berland	Hors influence	Urbaine	119	114	7	5	77

Exposition chronique

- Valeur cible
- Objectif de qualité — 120 µg/m³
- Recommandations OMS — 3 j max
- 25 j max
- 60 µg/m³

Exposition aiguë

- Seuils d'alerte — 240 µg/m³ sur 3 h; 300 µg/m³ sur 3 h
- Seuil d'information et Recommandations — 360 µg/m³; 180 µg/m³

Ozone O_3 / protection des écosystèmes

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	AOT40	AOT40 (moy. 5 ans)
17	Aytré*	Hors influence	Périurbaine	-	8 607
23	MERA	Hors influence	Rurale Nationale	4 153	6 884
33	Ambès	Hors influence	Périurbaine	4 069	7 310
	Le Temple	Hors influence	Rurale Régionale	4 202	7 477
64	Biarritz - Hippodrome	Hors influence	Périurbaine	3 604	6 533
	ZI Lacq - Labastide-Cézéracq	Hors influence	Rurale Proche	4 772	8 481
79	Airvault - Stade Laillé	Hors influence	Périurbaine	1 972	7 465
	Forêt Chizé Zoodyssée	Hors influence	Rurale Régionale	2 170	7 227
87	Le Palais-sur-Vienne	Hors influence	Périurbaine	4 536	6 389

Exposition chronique

- Valeur cible : 18 000 (µg.m^{-3}).h
- Objectif de qualité : 6 000 (µg.m^{-3}).h

* Les critères de validité de la statistique ne sont pas respectés pour la station *Aytré*, ainsi certains indicateurs ne sont pas disponibles.

L'AOT40 sur 1 an et l'AOT40 sur 5 ans sont des indicateurs réglementaires pour la protection des écosystèmes calculés uniquement pour les stations périurbaines et rurales.

Dioxyde de soufre SO_2

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	max. horaire	nb. heures > 350 µg/m³	nb. jours > 125 µg/m³	nb. jours > 40 µg/m³
33	Bassens	Industrielle	Urbaine	481	1	0	0
40	Tartas Pelletrin	Industrielle	Périurbaine	47	0	0	0
64	ZI Lacq - Lacq	Industrielle	Rurale Proche	466	1	0	3
	ZI Lacq - Labastide-Cézéracq	Industrielle	Rurale Proche	48	0	0	0
	ZI Lacq - Lagor	Industrielle	Rurale Proche	570	1	0	0
	ZI Lacq - Maslacq	Industrielle	Rurale Proche	211	0	0	1
	ZI Lacq - Mourenx	Industrielle	Rurale Proche	306	0	0	0
79	Airvault - Stade Laillé	Industrielle	Périurbaine	79	0	0	0
87	Saint-Junien	Hors influence	Urbaine	9	0	0	0
	Saillat-sur-Vienne	Industrielle	Rurale Proche	16	0	0	0

Exposition chronique

- Valeur limite : 25 h max ; 3 j max
- Recommandations OMS : 3 j max

Exposition aiguë

- Seuil d'alerte : 500 µg/m³ sur 3 h
- Seuil d'information et Recommandations : 300 µg/m³

Monoxyde de carbone CO

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	max. de la moy. sur 8 heures	max. horaire	nb. jours > 4 mg/m³
86	Poitiers centre	Hors influence	Urbaine	1	1	0

Exposition chronique	Valeur limite	10 mg/m³		
	Recommandations OMS	10 mg/m³	35 mg/m³	3 j max

Benzène C_6H_6

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	moy. annuelle
23	Guéret	Hors influence	Urbaine	1
33	Bordeaux - Gautier	Trafic	Urbaine	1

Exposition chronique	Valeur limite	5 µg/m³
	Objectif de qualité	2 µg/m³

Benzo(a)pyrène B(a)P

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	moy. annuelle
33	Talence	Hors influence	Urbaine	0

Exposition chronique	Valeur cible	1 ng/m³

Métaux lourds

Dépt.	Nom station	Influence	Implantation	Pb - moy. annuelle	As - moy. annuelle	Cd - moy. annuelle	Ni - moy. annuelle
23	Guéret	Hors influence	Urbaine	0	0	0	0

Exposition chronique	Valeur limite	0,5 µg/m³			
	Valeur cible		6 ng/m³	5 ng/m³	20 ng/m³
	Objectif de qualité	0,25 µg/m³			
	Recommandation OMS	0,5 µg/m³			

Comprendre l'affichage des concentrations mesurées

L'affichage des concentrations mesurées doit répondre aux exigences du Guide méthodologique pour le calcul des statistiques relatives à la qualité de l'air (2024) du LCSQA. Ce guide détermine notamment le nombre de décimales et le type d'arrondi à appliquer, selon le polluant ciblé.
Lorsque les concentrations sont comparées à leurs seuils réglementaires applicables, comme c'est le cas dans cette annexe 3, le nombre de décimales à faire apparaître doit posséder la même précision que le seuil réglementaire appliqué à la valeur mesurée. Par exemple, le seuil réglementaire « valeur cible » du Cadmium (Cd) est de 5 ng/m³ en moyenne annuelle. La concentration mesurée pour ce polluant doit être notée avec la même précision, c'est-à-dire avec zéro décimale, une fois les règles d'arrondis appliquées.

ANNEXE 4 / GÉNÉRALITES SUR LES POLLUANTS

Les émissions de polluants représentées sur les graphiques de cette annexe datent de 2022, et non pas 2024 comme l'année des mesures de concentrations de ce bilan annuel. L'estimation des émissions de polluants atmosphériques d'une part et la mesure des concentrations de certains polluants d'autre part, sont deux procédés totalement différents. Un inventaire des émissions découle de l'estimation des quantités de polluants rejetées dans l'air, et pour ce faire, les calculs nécessitent l'accès à des centaines d'informations, publiques ou non, dont la disponibilité n'est pas immédiate. Le délai entre la mise à disposition de données indispensables à l'inventaire des émissions et la réalisation des calculs explique l'écart de 2 ans entre l'inventaire des émissions de 2022 et les mesures de concentrations (issues de mesures) reprises dans ce bilan annuel de 2024. Les zones oranges et rouges des cartes caractérisent les incendies de feux de forêt de 2022.
Les paragraphes des effets sur la santé sont issus d'Atmo France et du ministère de l'Écologie.

Ozone O_3

Ses sources d'émissions // Polluant secondaire parce qu'il n'est pas émis dans l'air directement : il est le fruit de transformations chimiques de polluants (notamment NO_x et COV) dans l'atmosphère sous l'effet des rayonnements ultra-violets.
Effets sur la santé // Agression des voies respiratoires, toux, altération pulmonaire, irritations oculaires.
Effets sur l'environnement // Néfaste sur la végétation et le rendement des cultures, néfaste sur les matériaux comme le caoutchouc. Contribue à l'effet de serre.

Dioxyde d'azote NO_2 et Oxydes d'azote NO_x

Toute combustion d'énergie produit du NO et du NO_2, mais le NO est rapidement transformé en NO_2. Le NO_2 est un polluant fortement affilié au transport routier. Même si les progrès technologiques diminuent les émissions, la hausse régulière du trafic réduit le gain sur les concentrations mesurées.
À noter // le terme NO_x (oxydes d'azote) regroupe le NO (monoxyde d'azote) et le NO_2 (dioxyde d'azote), il fait donc référence à la somme de ces deux composés.
Comprendre // La plupart des seuils réglementaires de ces polluants est affectée au NO_2 car il est plus nocif pour la santé que le NO.
Effets sur la santé // Irritation des voies respiratoires, altération de la fonction respiratoire, augmentation de la fréquence et gravité des crises d'asthme, accroissement de la sensibilité des bronches aux infections chez l'enfant.
Effets sur l'environnement // Production du polluant ozone (O_3) situé dans la basse atmosphère et rôle dans la formation des pluies acides.

Emissions d'oxydes d'azote en 2022



+ de détails sur les émissions ici

Dioxyde de soufre SO_2

La combustion de matières fossiles, comme le charbon, le fuel ou le gazole, produit du SO_2. La combustion du bois rejette aussi du SO_2. Certains procédés industriels en émettent également.
Effets sur la santé // Irritation des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures, toux, gênes respiratoires. Effets amplifiés par le tabagisme, comme pour tous les polluants.
Effets sur l'environnement // Dégradation de la pierre et matériaux des monuments. Pluies acides par transformation en acide sulfurique au contact de l'humidité de l'air.



Emissions de dioxyde de soufre en 2022

Particules grossières PM_{10} et Particules fines $PM_{2,5}$

Le chauffage résidentiel, les activités industrielles variées, le transport routier et l'agriculture sont les principaux émetteurs des particules primaires.

Effets sur la santé // Selon leur taille, les particules peuvent s'enfoncer plus ou moins profondément dans l'arbre pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Des propriétés mutagènes et cancérigènes sont attribuées à certaines particules.

Effets sur l'environnement // Salissure des bâtiments et monuments.

Emissions de particules grossières en 2022



Emissions de particules fines en 2022



Benzène C_6H_6

Hydrocarbure aromatique, le benzène appartient à la famille des COV (composés organiques volatils). Il est un constituant du pétrole brut, des carburants et du gaz naturel. La combustion incomplète de composés riches en carbone produit du benzène lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour que la combustion soit achevée à 100%.

Effets sur la santé // Troubles digestifs et neurologiques. Irrite la peau et induit des lésions oculaires superficielles. Comme les COV, les effets sanitaires sont variables (gêne olfactive, effets mutagènes, cancérigènes, diminution capacité respiratoire...). Intervient dans la formation d'ozone dans la basse atmosphère, nocif pour la santé.

Effets sur l'environnement // Intervention dans la formation d'ozone dans la haute atmosphère.

Benzo(a)pyrène B(a)P

Appartenant à la famille des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), le benzo(a)pyrène provient notamment de la combustion de matières fossiles.

Effets sur la santé // Étant adsorbés sur les particules fines ($PM_{2,5}$), les HAP pénètrent plus ou moins profondément dans les voies respiratoires. Risque de cancer connu depuis longtemps.

Effets sur l'environnement des HAP // Bio-accumulation par la faune et la flore.

Métaux lourds : Arsenic As, Cadmium Cd, Nickel Ni, Plomb Pb

Les activités résidentielles, le transport routier, l'agriculture et les procédés industriels rejettent dans l'air des métaux lourds.

Effets sur la santé // Accumulation dans l'organisme. Effets toxiques sur le système nerveux, les fonctions rénales, les respirations ou autres.

Effets sur l'environnement // Accumulation par les organismes vivants. Perturbation des équilibres biologiques. Contamination des sols et des aliments. Certains lichens et mousses sont utilisés comme bio-indicateurs pour surveiller la présence des métaux lourds dans l'environnement.

Monoxyde de carbone CO

La combustion incomplète de composés riches en carbone produit du monoxyde de carbone lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour que la combustion soit achevée à 100%.

Effets sur la santé // Manque d'oxygénation de l'organisme par remplacement de l'oxygène présent dans l'hémoglobine du sang par le monoxyde de carbone. Maux de tête, vertiges, nausées, vomissements sont les symptômes rencontrés et le coma ou la mort peuvent survenir si les concentrations dans l'air de CO augmentent. Intervient dans la formation d'ozone dans la basse atmosphère, nocif pour la santé.

Effets sur l'environnement // Transformation en dioxyde de carbone (CO_2) et contribution à l'effet de serre.

ANNEXE 5 / MÉTHODES DE MESURE DES POLLUANTS

Mesures automatiques			
Caractéristique mesurée	Matériel	Référence de la méthode	Accréditation
Concentration en oxydes d'azote (NOx)	Analyseurs automatiques	NF EN 14211 - Dosage du dioxyde d'azote et du monoxyde d'azote par chimiluminescence	ACCRÉDITATION COFRAC N° 1-6354* Portée disponible sur www.cofrac.fr
Concentration en dioxyde de soufre (SO_2)		NF EN 14212 - Dosage du dioxyde de soufre par fluorescence UV	
Concentration en ozone (O_3)		NF EN 14625 - Dosage de l'ozone par photométrie UV	
Concentration en monoxyde de carbone (CO)		NF EN 14626 - Dosage du monoxyde de carbone par rayonnement infrarouge non dispersif	
Concentration en particules		NF EN 16450 - Systèmes automatisés de mesurage de la concentration de matière particulaire (PM_{10} ; $PM_{2,5}$)	
Mesures par prélèvement suivi d'une analyse chimique			
Caractéristique mesurée	Matériel	Référence de la méthode de prélèvement et d'analyse	
Concentration en benzène	Préleveur	NF EN 14662-4 - Prélèvement par diffusion suivi d'une désorption thermique et d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse	
Concentration en B(a)P		NF EN 15549 - Méthode normalisée pour la mesure de la concentration du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant	
Concentration en métaux lourds (plomb, cadmium, arsenic et nickel)		NF EN 14902 - Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de matière particulaire en suspension	

* Les avis et interprétations ne sont pas couverts par l'accréditation COFRAC d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Toute utilisation des données d'Atmo Nouvelle-Aquitaine, couvertes par l'accréditation doit faire mention : "Ces essais ont été réalisés par Atmo Nouvelle-Aquitaine – Accréditation n°1-6354, portée disponible sous www.cofrac.fr", sans y associer le logo COFRAC. Les rapports d'Atmo Nouvelle-Aquitaine sont disponibles sur demande et préciser que les rapports d'Atmo Nouvelle-Aquitaine sont disponibles sur demande ou joindre ces derniers dans leur intégralité au document rapportant ces résultats.

votre parten'air Atmo NOUVELLE-AQUITAINE

RETROUVEZ TOUTES
NOS **PUBLICATIONS** SUR :
www.atmo-nouvelleaquitaine.org

CONTACT

contact@atmo-na.org
Tél. : 09 84 200 100

Pôle Bordeaux (siège social)
ZA Chemin Long - 13 allée James Watt
33 692 Mérignac Cedex

Pôle La Rochelle (adresse postale-facturation)
ZI Périgny/La Rochelle - 12 rue Augustin Fresnel
17 180 Périgny

Pôle Limoges
Parc Ester Technopole - 35 rue Soyouz
87 068 Limoges Cedex

Avec le concours financier de
l'État et de la Région

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité

RÉGION Nouvelle-Aquitaine